


## 新医薬品の薬価算定について

整理番号	15-02-内-2		
薬効分類	232 消化性潰瘍用剤（内用薬）		
成分名	ラベプラゾールナトリウム		
新薬収載希望者	エーザイ（株）		
販売名 （規格単位）	パリエット錠5mg（5mg1錠）		
効能・効果	<p>胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison 症候群、非びらん性胃食道逆流症、低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制</p> <p>下記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助</p> <p>胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃 MALT リンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎</p>		
主な用法・用量	<p>&lt;胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、Zollinger-Ellison 症候群&gt; 通常、成人には1回10mgを1日1回投与、病状により1回20mgを1日1回経口投与できる。</p> <p>&lt;逆流性食道炎&gt; 通常、成人には1回10mgを1日1回投与、病状により1回20mgを1日1回経口投与できる。再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法においては、1回10mgを1日1回投与する。</p> <p>&lt;非びらん性胃食道逆流症&gt; 通常、成人には1回10mgを1日1回投与する。</p> <p>&lt;低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制&gt; 通常、成人には1回5mgを1日1回投与、効果不十分の場合は1回10mgを1日1回投与できる。</p> <p>&lt;ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助&gt; 通常、成人には1回10mg、アモキシシリン水和物として1回750mg（力価）及びクラリスロマイシンとして1回200mg（力価）の3剤を同時に1日2回、7日間投与する。</p>		
算 定	算定方式	規格間調整	
	比 較 薬	成分名：ラベプラゾールナトリウム 会社名：エーザイ（株）	
		販売名（規格単位）	薬価
		パリエット錠10mg（10mg1錠）	132.60円
規格間比	パリエット錠10mgと同20mg規格間比：0.9120		
外国調整	なし		
算定薬価	5mg1錠	70.50円	
外国価格		新薬収載希望者による市場規模予測	
なし		予測年度	予測本剤投与患者数
最初に承認された国：日本		（ピーク時） 8年度	12万人
			予測販売金額 18億円
製造販売承認日	平成26年12月26日	薬価基準収載予定日	平成27年2月24日

薬価算定組織における検討結果のまとめ

算定方式		規格間調整		第一回算定組織		平成27年1月30日		
最類似薬選定の妥当性			新薬				最類似薬	
	成分名		ラベプラゾールナトリウム				左に同じ	
	イ. 効能・効果		<p>胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison症候群、非びらん性胃食道逆流症、低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制、下記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助</p> <p>胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃 MALT リンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎</p>				左に同じ	
	ロ. 薬理作用		プロトンポンプ阻害作用				左に同じ	
	ハ. 組成及び化学構造						左に同じ	
	ニ. 投与形態 剤形 用法		<p>内用</p> <p>錠剤</p> <p>1日1回</p>				<p>左に同じ</p> <p>左に同じ</p> <p>左に同じ</p>	
補正加算	画期性加算 (70~120%)		該当しない					
	有用性加算 (I) (35~60%)		該当しない					
	有用性加算 (II) (5~30%)		該当しない					
	市場性加算 (I) (10~20%)		該当しない					
	市場性加算 (II) (5%)		該当しない					
	小児加算 (5~20%)		該当しない					
当初算定案に対する新薬収載希望者の不服意見の要点								
上記不服意見に対する見解		第二回算定組織		平成 年 月 日				